

## 시험대상자 모집 공고문

오스틴제약(주)의 “피타젯정4/10mg(피타바스타틴칼슘, 에제티미브)”과  
제이더블유중외제약(주)의 “리바로젯정4/10밀리그램”의  
생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인 시험대상자에서의  
공개, 무작위배정, 공복, 단회, 경구투여, 2군, 2기, 교차시험

Protocol No.	KMRI-BE-26002
Supplement No.	2
Supplement Version	1.0
Date	2026-02-06

### **CONFIDENTIAL**

본 임상시험 별첨에 포함되어 있는 모든 정보는 임상시험책임자 및 위임을 받은 자, 임상시험심사위원회, 식품의약품안전처를 위해 제공된 것으로서, 임상시험용 의 약품을 투여 받을 사람에게 시험참여에 대한 서면동의를 받기 위한 경우를 제외하 고는 오스틴제약(주)의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 공개될 수 없습니다.

\* [Protocol Supplement 2]는 임상시험 계획서와 별도로 version을 관리하며, 추후 변경될 경우에도 임상시험 계획서의 변동 없이 별개로 진행한다.

**[Protocol Supplement 2]****시험대상자 모집 공고문(내/외부용)**

시험제목	오스틴제약주의 “피타젯정4/10mg(피타바스타틴칼슘, 에제티미브)” 과 제이더블유중외제약주의 “리바로젯정4/10밀리그램”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인 시험대상자에서의 공개, 무작위배 정, 공복, 단회, 경구투여, 2군, 2기, 교차시험
------	--

**1. 시험 목적**

본 시험은 시험약인 오스틴제약주의 “피타젯정4/10mg(피타바스타틴칼슘, 에제티미브)”과 대조약인 제이더블유중외제약주의 “리바로젯정4/10밀리그램”을 공복에 각각 경구 투여해 두 제제간의 생체이용률(체내 흡수율)과 안전성을 비교평가하기 위해 실시합니다.

**2. 자격 및 선정요건**

- 스크리닝 시 연령이 19세 이상 55세 이하인 자
- 비만도 지표 BMI가 18~30 kg/m<sup>2</sup>인 자(BMI 계산: 체중(kg)/키(m)<sup>2</sup>)
  - 남성의 경우 50kg 이상인 자
  - 여성의 경우 45kg 이상인 자
- 정신 질환의 병력이 없으며 현재 치료 중인 선천성 질환 또는 만성 질환, 감염성 질환(B형 간염, C형 간염, 에이즈, 매독 등) 등 병적 증상이 없는 자
- 임상시험용 의약품 첫 투약일 전 30일 이내에 약물대사효소를 현저히 유도(예: 바르비탈류) 또는 억제하는 약물 및 10일 이내에 시험에 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용하지 않은 자

- 임상시험용의약품 첫 투약일 6개월 이내에 생물학적 동등성시험 또는 기타 임상시험에 참여하여 시험용 의약품을 투약한 경험이 없는 자
- 임상시험용의약품 첫 투약일 전 8주 이내 전혈 헌혈 또는 2주 이내 성분 헌혈을 하지 않은 자
- 임상시험용의약품 첫 투약일 전 1개월 이내에 아래와 같은 정기적인 알코올 섭취의 이력이 없는 자
  - 남성의 경우 평균 21잔/week 초과
  - 여성의 경우 평균 14잔/week 초과
- 시험 설명서의 내용을 충분히 이해한 후, 동의서에 자의로 서명한 자
- 모든 예정된 일정, 검사 및 준수사항을 따를 수 있고 그러한 의지가 있는 자

### 3. 효능·효과 및 예측 가능한 부작용

#### 1) 효능·효과

원발성 고콜레스테롤혈증

원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족형 및 비가족형) 또는 혼합형 이상 지질혈증 환자의 상승된 총 콜레스테롤(total-C), LDL-콜레스테롤(LDL-C), 아포 B 단백질(Apo B), 트리글리세라이드(TG) 및 non-HDL-콜레스테롤을 감소시키고, HDL-콜레스테롤(HDL-C)을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제로서 이 약을 투여한다.

#### 2) 예측 가능한 부작용

복통, 발진, 권태감, 사지근력저하, 감각저하, 가려움증, 간수치 상승 (AST(GOT), ALT(GPT),  $\gamma$ -GTP 상승), CPK(근육효소수치) 증가, 근육통, 피로, 설사, 소화불량, 어지러움, 두통 등

(상기 예측 가능한 부작용 외 예상하지 못한 부작용도 드물지만 발생할 수 있습니다.)

#### 4. 시험방법 및 주의사항

##### 1) 시험대상자 선발절차

본 시험에 자원하신 분들은 임상시험의 목적과 방법에 대한 상세한 설명을 들은 후 스크리닝 시에 활력징후 측정, 진단검사 등을 실시하고, 시험대상 적합자로 판정된 분들을 최종 시험대상자로 선정합니다.

##### 2) 시험일정

- ① 스크리닝 1회
- ② 1기: 입원(2박 3일) 1회 +외래방문 2회
- ③ 휴약기: 2주
- ④ 2기: 입원(2박 3일) 1회 +외래방문 2회

##### 3) 모집인원: 60 명

##### 4) 기타사항

- 시험 참여자는 차등지급기준에 따라 사례비를 지급받습니다.  
(스크리닝에만 참여하신 분들은 사례비가 지급되지 않습니다.)

##### 5) 스크리닝 주의사항

- 스크리닝 전 8시간 이상 금식하고 오십시오.
- 복용중인 약이 있을 경우 처방전/소견서 지참하여 방문해 주십시오.
- 스크리닝 시간에 늦지 않도록 준수하여 주십시오.
- 스크리닝은 시험에 관한 오리엔테이션 등을 포함하여 약 2시간 이상 소요됩니다.

## 5. 신청 및 참여 문의

- **참여문의: 부민병원(서울) 임상시험센터 데스크 02-2620-0248**  
    **시간 09:30~17:30(평일)**
  
- **의뢰자: 오스틴제약(주), 경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20**  
    **031-494-9681(507)**
  
- **시험책임자: 부민병원(서울)임상시험센터, 서울시 강서구 공항대로 375**  
    **02-2620-0254 정 재 완**

모집공고 게재일 : 2026년 04월 02일