

시험대상자 모집공고문

디케이에스에이치코리아㈜의 “아타칸정32밀리그램(제조소 변경후)”과
디케이에스에이치코리아㈜ “아타칸정32밀리그램(제조소 변경전)”의
생물학적 동등성평가를 위한 건강한 성인 시험대상자에서의
공개, 무작위배정, 공복, 단회, 경구 투여, 2군, 2기, 교차시험

Protocol No.	23-2803-BE070
Supplement No.	2
Supplement Version	1.1
Version date	2024-11-20

CONFIDENTIAL

본 임상시험 별첨에 포함되어 있는 모든 정보는 임상시험책임자 및 위임을 받은 자, 임상시험심사위원회, 식품의약품안전처를 위해 제공된 것으로서, 임상시험용의약품을 투여 받을 사람에게 시험참여에 대한 서면동의를 받기 위한 경우를 제외하고는 CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 공개될 수 없습니다

* [Protocol Supplement 2]는 임상시험 계획서와 별도로 version을 관리하며, 추후 변경될 경우에도 임상시험 계획서의 변동 없이 별개로 진행한다.

[Protocol Supplement 2]

시험대상자 모집공고문(내/외부용)

임상시험 제목	디케이에스에이치코리아㈜의 “아타칸정32밀리그램(제조소 변경후)”과 디케이에스에이치코리아㈜ “아타칸정32밀리그램(제조소 변경전)”의 생물학적 동등성평가를 위한 건강한 성인 시험대상자에서의 공개, 무작위배정, 공복, 단회, 경구 투여, 2군, 2기, 교차시험
---------	--

1. 시험 목적

부민병원(서울) 임상시험센터에서는 임상시험에 참여할 건강한 성인 자원자를 모집합니다.

본 시험은 시험약인 디케이에스에이치코리아㈜의 “아타칸정 32 밀리그램(제조소 변경후)”과 대조약인 디케이에스에이치코리아㈜ “아타칸정 32 밀리그램(제조소 변경전)”의 경구투여 시 약동학적 특성 및 안전성을 비교 평가하기 위해 실시합니다.

2. 자격 및 선정요건

- 스크리닝 시 연령이 19세 이상 50세 미만인 자
- 비만도 지표 BMI가 18.0~30.0 인 자[BMI: 체중(kg) / {키(m)}²]
 - 남성의 경우 50kg 이상인 자
 - 여성의 경우 45kg 이상인 자
- 정신 질환의 병력이 없으며 현재 치료 중인 선천성 질환 또는 만성 질환, 감염성 질환(B형 간염, C형 간염, 에이즈, 매독 등) 등 병적 증상이 없는 자
- 첫 투약일 전 30일 이내에 약물대사효소를 현저히 유도(예: 바르비탈류) 또는 억제하는 약물 및 10일 이내에 시험에 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용하지 않은 자
- 첫 투약일 전 6개월 이내에 생물학적 동등성시험 또는 기타 임상시험에 참여하여 시험용 의약품을 투약한 경험이 없는 자
- 첫 투약일 전 8주 이내에 전혈 헌혈 또는 2주 이내에 성분 헌혈을 하지 않은 자
- 첫 투약일 전 1개월 이내에 아래와 같은 정기적인 알코올 섭취의 이력이 없는 자
 - 남성의 경우 평균 21잔/week 초과
 - 여성의 경우 평균 14잔/week 초과
- 시험 설명서의 내용을 충분히 이해한 후, 동의서에 자의로 서명한 자

- 모든 예정된 일정, 검사 및 준수사항을 따를 수 있고 그러한 의지가 있는 자

3. 효능·효과 및 예측 가능한 부작용

1) 효능·효과

1. 본태고혈압

2. 심부전: 좌심실수축기능이 손상된(NYHA class II-IV, 좌심실박출률 40% 이하) 환자 중 다음에 해당하는 경우

1) ACE억제제에 대한 추가요법이 필요한 경우

2) ACE억제제에 내약성이 좋지 않은 경우

2) 예측 가능한 부작용

- 어지럼, 두통, 기침, 요통, 호흡기감염, 피로, 말초부종, 홍통, 구역, 복통, 설사, 구토, 무력증, 발열, 소화불량, 빈맥(심박수가 정상 범위를 벗어나 더 빨라진 상태), 심계항진(불규칙하거나 빠른 심장 박동이 비정상적으로 느껴지는 증상), 크레아틴키나아제(근육효소 수치) 증가, 불안, 우울증, 호흡곤란, 발진 등

(상기 예측 가능한 부작용 외 예상하지 못한 부작용도 드물지만 발생할 수 있습니다.)

4. 시험방법

1) 시험대상자 선발절차

본 시험에 자원하신 분들은 임상시험의 목적과 방법에 대한 상세한 설명을 들은 후 스크리닝 시에 활력징후 측정, 신체검사, 진단검사 등을 실시하고, 시험대상 적합자로 판정된 분들을 최종 시험대상자로 선정합니다.

2) 시험일정

- | |
|----------------------------|
| ① 스크리닝 1회 |
| ② 1기: 입원(2박 3일) 1회+외래방문 1회 |
| ③ 휴약기: 7일 |
| ④ 2기: 입원(2박 3일) 1회+외래방문 1회 |

3) 모집인원: 36 명**4) 기타사항**

- 1기에 시험약 또는 대조약에 배정되는 확률은 각각 50%로 무작위 배정되며 제 1기 및 제 2기에 교차로 투약됩니다.
- 시험 참여자는 차등지급기준에 따라 사례비를 지급받습니다. (스크리닝에만 참여하신 분들은 사례비가 지급되지 않습니다.)

5) 스크리닝 주의사항

- 스크리닝 전 8시간 이상 금식하고 오십시오.
- 복용중인 약이 있을 경우 처방전/소견서 지참하여 방문해 주십시오.
- 스크리닝 시간에 늦지 않도록 준수하여 주십시오.
- 스크리닝은 시험에 관한 오리엔테이션 등을 포함하여 약 2시간 이상 소요됩니다.

5. 신청 및 참여 문의

- 참여문의: 임상시험센터 데스크 02-2620-0248
시간 09:30~17:30(평일)
- IND holder(의뢰자 대신): 디케이에스에이치코리아㈜ 서울특별시 서초구 효령로 267, 3층
(서초동, 명인타워) 담당자 02-2192-9500
- 시험책임자: 부민병원(서울) 임상시험센터, 서울특별시 강서구 공항대로 375
02-2620-5107 박 현 수

모집공고 게재일 : 2025년 01월 03일